

Escala de valoración del riesgo potencial de opioides (ORT)



Adaptado y traducido de Webster LR, Webster R. *Predicting aberrant behaviors in Opioid-treated patients: preliminary validation of the Opioid Risk Tool*. Pain Med. 2005; 6(6):432

Datos de identificación del paciente

FECHA:

	Mujeres	Hombres
ANTECEDENTES FAMILIARES DE ABUSO DE SUSTANCIAS:		
Alcohol	1	3
Drogas ilegales	2	3
Medicamentos	4	4
ANTECEDENTES PERSONALES DE ABUSO DE SUSTANCIAS:		
Alcohol	3	3
Drogas ilegales	4	4
Medicamentos	5	5
EDAD (marcar si la edad esta entre 16 y 45 años)		
	1	1
ANTECEDENTES DE ABUSO SEXUAL		
	3	0
ENFERMEDAD PSIQUIÁTRICA:		
Déficit de atención, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno bipolar, esquizofrenia	2	2
Depresión	1	1
PUNTUACIÓN TOTAL:		

Riesgo bajo: 1-3. Riesgo moderado: 4-7 (se pueden usar analgésicos opioides con una monitorización cuidadosa y un seguimiento adecuado del paciente). **Riesgo alto: ≥ 8** (en este caso, si es posible, evitar el uso de analgésicos opioides).